
Schädel-Röntgenbefunde
bei Epilepsie.

Halle-Wittenberg

Johannes Jentsch.

Schädel-Röntgenbefunde bei Epilepsie.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der
Doktorwürde in der Medizin und Chirurgie
mit Genehmigung
der hohen medizinischen Fakultät der vereinigten
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt am 9. Oktober 1919 von
Johannes Jentzsch, approbierter Arzt
aus Dresden.



Druck: Heinr. Rehmann,
Bockenem a./H., 1920.

Referent: Herr Geh. Rat Prof. Dr. Anton.

Seinen lieben Eltern

in Dankbarkeit gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die röntgenologische Untersuchungsmethode stellt heutzutage ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel der neurologischen Diagnostik dar. Bei der Neuro-Röntgenologie sind die Organe Gehirn, Rückenmark und Nervenstränge nicht in der Weise darstellbar, und erkennbar, wie z. B. das Herz. Sie sind von zu dichten Knochenhüllen umgeben, um überhaupt verwertbare Schattenbilder zu liefern. Deswegen ist das Verdienst derer unendlich groß, die sich den Veränderungen zuwandten, die bei Erkrankungen des Nervensystems und des Gehirns an dessen knöchernen Hüllen zu sehen sind. Pathologische Veränderungen des intracraniellen Inhalts lassen sich nur dann röntgenographisch direkt feststellen, wenn es zur Bildung von Verkalkungs- oder Verknöcherungsherden gekommen ist, wie dies mitunter in Geschwülsten, Tuberkeln, Erweichungsherden etc. des Gehirns, der Gehirnhäute und der cerebralen Anhangsdrüsen der Fall ist. Weit häufiger als die direkt erkennbaren intracraniellen Herde sind Veränderungen der Schädelkapsel feststellbar, welche durch die Gegenwart intracranieller Erkrankungen hervorgerufen sind, wie sie bei Geschwülsten und anderweitigen zu chronischer Hirndrucksteigerung führenden Affektionen des intracraniellen Inhalts vorkommen.

Welchen Wert und welche Bedeutung Schädel-Röntgenbilder bei Gehirnerkrankungen und Entwicklungsstörungen haben, wollen wir in kurzen Worten hier darlegen. Unter den Gehirnerkrankungen, die durch Schädel-Röntgenbilder diagnostiziert werden können, sind vor allen Dingen die Hirntumoren zu nennen, besonders die Hypophysentumoren. Die Unter-

scheidung der verschiedenen Typen der Hypophysentumoren kann man nach Erdheim am queren Durchleuchtungsbild des Schädels nach der Form der Sella=destruktion durchführen. Bei Fällen, wo die klinische Untersuchung unklare oder uncharakteristische Symptome zutage fördert, ermöglicht der röntgenologische Nachweis einer typischen Sella Usur allein die frühzeitige Fixierung der Diagnose. Aus der charakteristischen Form der Sella=destruktion am Röntgenbild konnte die Diagnose Hypophysentumor in einer Zeit gestillt werden, da außer Sehstörungen oder unbestimmten Kopfschmerzen keine anderen klinischen Symptome nachweisbar waren.

Geradezu unentbehrlich ist der röntgenologische Nachweis für die Indicationsstellung zur operativen Behandlung des Hypophysentumors. Durch das Röntgenbild wird Grösse und Form der Sella=Usur genau dargestellt und außerdem kann sich der Chirurg darüber orientieren, auf welchem Wege er die Hypophyse erreichen kann. Durch wiederholte Röntgenuntersuchung kann man sich auch über das eventuelle Fortschreiten der Grösse des Tumors unterrichten.

Eine zweite Form von Tumoren, welche lokale Destruktionen der Schädelbasis hervorrufen, sind die Acousticustumoren. Auch hier kann man durch das Röntgenbild Schädelveränderungen erkennen, die für die Diagnose von großem Wert sind. Die Verdünnung und Vorwärtsneigung der Sattellehne ist ein Zeichen, das die Diagnose Acousticustumor unbedingt sichert. Von Bedeutung wiederum ist auch hier das Röntgenbild für den Chirurgen, da es Aufschluß gibt über die Beschaffenheit (Dicke, Dichte, Gefäßfurchen) der Schädelswandpartien, die für die Trepanation in Frage kommen. Endlich seien auch noch die Tumoren der Gehirnbasis

(Gliome, Sarcome, Endotheliome, Fibrome, Cholesteatome, Tuberkel, Syphilome, Cysten) erwähnt, die ebenfalls Schädelveränderungen hervorrufen, deren Feststellung durch das Röntgenbild äußerst wertvoll ist. Liegt der Tumor in der mittleren Schädelgrube extramedian, so wird man am Röntgenbilde eine asymmetrische Fissur der am Eingang der Sella liegenden Knochenvorsprünge in Kombination mit Erweiterung des Sinus sphenoparietalis der gleichen Seite feststellen können. Ist hingegen die Geschwulst in der vorderen, bezw. hinteren Schädelgrube gelegen, so wird man am Röntgenbild eine isolierte Usur der vorderen, bzw. hinteren Knochenvorsprünge am Eingang der Sella sehen können.

Es zeigt sich also, wie groß die Verwertbarkeit der röntgenologischen Diagnostik bei Hirntumoren ist. Sie ergänzen ganz bedeutungsvoll das Ergebnis der übrigen klinischen Untersuchung sowohl bezüglich der Frage nach der Art der intracraniellen Erkrankung, als auch nach dem Sitz derselben.

Von großem diagnostischem Wert ist aber auch die Feststellung allgemeiner Usur der Schädelinnenfläche durch das Röntgenbild, da sie ein sicheres Zeichen einer seit längerer Zeit bestehenden Hirndrucksteigerung ist, wie sie bei Hydrocephalie, Hirnhypertrophie und Craniostenose vorkommt. Nach Schüller steht die diagnostische Verwertbarkeit der Usurierung des Schädels keineswegs hinter der einer Stauungspapille zurück, die ja bekanntlich als eines der sichersten, frühesten und häufigsten Symptome von Hirndrucksteigerung angesehen wird.

Jedoch ermöglicht das Röntgenbild nicht allein festzustellen, ob überhaupt Hirndrucksteigerung vorhanden ist, sondern man kann auch durch dasselbe nachweisen,

wo der die Drucksteigerung bedingende Prozeß sitzt, welcher Art er ist und wie groß seine Ausdehnung. Durch einseitig ausgeprägte Impressiones digitatae kann man die Schädelhälfte bestimmen, in welcher sich der Prozeß befindet. Ist außerdem noch eine lokale Destruktion der Schädelinnenfläche vorhanden, so ist nach oben Erwähnten ohne weiteres klar, daß man mit Sicherheit den genauen Sitz des drucksteigernden Prozesses feststellen kann. Von größter Bedeutung ist auch hier wieder das Röntgenbild für den Chirurgen, der sich genau über die Schäeldicke orientieren kann und damit imstande ist, den günstigsten Ort für den operativen Eingriff. sei es nun die Paliatiotrepanation nach Eiffelsberg oder den Balkenstich nach Anton-Bramann oder den Suboccipitalstich nach Anton-Schmieden zu wählen.

Sprachen wir bisher über Wert und Bedeutung von Schädelröntgenbefunden bei Gehirnerkrankungen, so wollen wir jetzt kurz beleuchten, welche Bedeutung das Schädel-Röntgenbild auch bei Anomalien des Schädelinhalts und Mißbildungen bzw. Entwicklungsstörungen des Schädels hat. Das Wachstum des Schädels und die endgültige Größe desselben hängt in der Hauptsache von der Masse seines Inhalts ab. Bleibt das Gehirn im Wachstum zurück, so ist meist der Schädel kleiner; hingegen verursacht eine abnorme Vergrößerung des Schädelinhalts auch eine übergroße Ausdehnung desselben, wobei natürlich vorauszusetzen ist, daß dies zu einer Zeit stattfindet, da der Schädel noch imstande ist, seine Größe zu verändern. Abnorme kleine Schädel findet man bei angeborener Bildungshemmung des Gehirns, also bei Mikrenkephalie, Porenkephalie, Mikrogyrie. Durch mangelhafte Entwicklung einzelner

Teile des Gehirns kommt partielle Mikrokephalie zufrande. Nicht sehr selten sind die Fälle von partieller Mikrenkephalie des Kleinhirns, wobei eine partielle Mikrokephalie in der Form einer mangelhaften Ausbildung der hinteren Schädelgrube mit normaler Beschaffenheit des übrigen Schädels zu beobachten ist. Anton erwähnt kompensatorische Verdickung der Wand der hinteren Schädelgrube bei Kleinhirnatrophie mit Hypertrophie des Großhirns und Verdünnung des übrigen Schädels. Er konnte die Diagnose bereits in vivo mit Hilfe des Röntgenbildes stellen.

Das Röntgenbild mikrokephaier Schädel ermöglicht, abgesehen von der Darstellung der Formverhältnisse, die Bestimmung der Dicke der Schädelwand und ihrer Innenfläche, sowie das Verhalten der Nähte und erlaubt somit ein Urteil über die Größe und Erweiterungsmöglichkeit des Schädelinnenraums, sowie die Diagnose einer partiellen Mikrokophalie zu stellen.

Bei den abnorm großen Schädeln (Megalo- und hydrocephalen Schädel) gestattet das Röntgenbild die Entscheidung, ob die Vergrößerung dadurch hervorgerufen ist, daß die Schädelwand sich verdickt, oder der Schädel sich infolge vermehrten Inhalts erweitert hat. Es erlaubt ferner die Feststellung der Beschaffenheit der Nähte (Obliterationen, Erweiterung) und die Bestimmung der Beschaffenheit der Schädelinnenfläche.

Eine andere Art der Entwicklungsstörung des Schädels ist die Schäeldifformität infolge prämaturer Nahtsinostose. Der Haupttypus dieser Art ist der Turmschädel, der auch bei der Epilepsie eine wichtige ätiologische Rolle spielt. Durch die Röntgenuntersuchung ist die Pathogenese der als Turmschädel bezeichneten Difformität wesentlich geklärt, sowie die Kenntnis über

die klinische Stellung dieser Anomalie weiter ausgedehnt worden. Im besondern gestattet das Röntgenbild die Unterscheidung der Craniostenose - womit man auch die durch Wachstumsstörung hervorgerufene prämatüre Synostose bezeichnet - von der Mikrokephalie, ferner auch von der durch Hirntumor oder Hydrokephalie bedingten intracraniellen Drucksteigerung und endlich von dem durch Hyperostose des Cranium vorgetäuschten Pseudotumorschädels. Auch für die Therapie ist die Röntgenuntersuchung von großer Bedeutung, soll man doch die bei Tumorschädel mit Erfolg geübte Palliativ-Trepanation oder falls die Craniostenose mit Hydrocephalus internus kombiniert ist, den Balkenstich nur dann vornehmen, wenn man durch das Röntgenbild genau unterrichtet ist, ob ein Mißverhältnis zwischen Hirn und Schädel existiert.

Wir sehen also, daß durch die Röntgenographische Darstellung der Entwicklungsstörungen des Gehirns und des Schädels die älteren Untersuchungsmethoden wesentlich ergänzt werden, da sie die durch die Weichteile verdeckten Schädelumrisse, ferner die Form- und Größenverhältnisse der Schädelbasis, die auf andere Art nicht erkennbar sind, anschaulich zur Darstellung bringen. Sie gestattet weiterhin, sich ein Bild zu machen von der Beschaffenheit der Schädelinnenfläche und auch von den Fugen und Nahtverhältnissen, die zum Verständnis der Schädel- und Gehirnanomalien sehr wichtig sind. Schließlich kann man durch wiederholtes Röntgen den Fortgang der abnormen Entwicklung verfolgen.

Für den Kliniker am wichtigsten sind natürlich die Röntgenbefunde, welche bei einer Reihe häufig vorkommender cerebraler Symptomenbilder beobachtet

werden. Fortgesetzte Studien haben gezeigt, daß die Schädel=Röntgenbefunde bei Epilepsie, mit denen wir uns in folgendem näher beschäftigen wollen, sehr oft wichtige Anhaltspunkte für die pathologische Auffassung des Falles ergaben und dazu beitrugen, die verschiedenen Arten der Epilepsien von einander zu unterscheiden.

Bevor wir jedoch die Schädel=Röntgenbefunde bei den verschiedenen Arten von Epilepsie (Entwicklung symptomatische. Spät= und traumatische Epilepsie) skizzieren, ergibt sich die Notwendigkeit, wenigstens in größten Umrissen auf die Aetiologie, Klinik und pathologische Anatomie einzugehen und fernerhin wollen wir bei der Besprechung der am Röntgenbild erkennbaren Schädelveränderungen bei Epilepsie diese Veränderungen auch kurz vom anatomisch=klinischen Standpunkt aus beleuchten.

Die Entwicklungsepilepsie darf man wohl als jene definieren, die eine unbekannte oder unklare Aetiologie hat oder als jene, die aus der Anlage des Individuums hervorgeht. Was die Heredität betrifft, die man in der Aetiologie der Entwicklungsepilepsie an erste Stelle setzt, so ist vor allen Dingen schwere Belastung und gleichartige und direkte Heredität wichtig. Zu den direkten Erbkrankheiten gehört aber die Epilepsie nicht, höchstens wird eine Disposition für das Auftreten von epileptischen Anfällen vererbt, wobei dann andere Schädlichkeiten zur wirklichen Auslösung der Krankheit notwendig sind. Exogene Schädlichkeiten können bei Epileptikern Anfälle auslösen, bei Disponierten die Krankheit selbst, aber auch ohne Disposition die Krankheit direkt bedingen. Bei den akuten Infektionskrankheiten kommt es vor allen Dingen auf die Entwicklung

meningo-encephalitischer Prozesse an. Von den chronischen Infektionskrankheiten ist die Syphilis von größter Bedeutung, die unter den verschiedensten Motilitäten Ursache zur Epilepsie werden kann.

Eine traumatische Epilepsie kann durch anatomische Verletzung des Schädels oder Gehirns ausgelöst sein, in anderen Fällen liegen aber feinere histologische Veränderungen des Gehirns vor. Von den Giften, die ätiologisch für die Epilepsie in Betracht kommen, ist der Alkohol das wichtigste. Er kann mit und ohne Disposition eine Epilepsie hervorrufen, die nach dauernder Abstinenz wieder verschwindet, in selteneren Fällen aber auch fortbestehen kann.

Pubertät und Menstruation haben nur die Bedeutung von auslösenden Momenten, letztere insbesondere auch für die Anfälle der Epilepticæ. Gravidität und Puerperium können eine bestehende Epilepsie günstig beeinflussen, häufiger jedoch wirken sie ungünstig.

Für die Fälle von symptomatischer Epilepsie spielen exogene Schädlichkeiten eine große Rolle. Aber auch hier gibt es Fälle ohne bekannte Aetiologie und mit direkt hereditärer Belastung. Ebenso ist hier stets an die Möglichkeit einer grobanatomischen Erkrankung, einer symptomatischen Auslösung der Anfälle zu denken. Für die Fälle symptomatischer Epilepsie ist pathogenetisch speziell die Arteriosclerose von großer Bedeutung.

Aus dem klinischen Bild kommt für die Abgrenzung der Entwicklungsepilepsie die verschiedene Ausgestaltung des epileptischen Anfalles in Betracht. Man hat den universellen Anfall der genuinen Epilepsie scharf unterscheiden wollen vom Jackson-Anfall der organischen Epilepsie. Aber alles, was man in dieser Hinsicht angegeben hat, hat keine durchgreifende

und allgemeine Gültigkeit. Bei der Entwicklungsepilepsie kommen partielle Krämpfe vor, speziell im Status epilepticus, andererseits kommen universelle Krämpfe auch bei der durch organische Hirnkrankheiten hervorgerufenen symptomatischen Epilepsie vor. Von den letzteren verdienen besonderes Interesse die *Cysticercosis cerebri* und der *Tumor cerebri* (speziell des rechten Stirn- u. Schläfenlappens und der Hypophyse). Lähmungserscheinungen nach Anfällen sind zwar nach typischen Jackson-Anfällen häufiger und ausgesprochener, gehören aber auch bei der Entwicklungsepilepsie als leichte, sogenannte Erschöpfungslähmungen zu den gewöhnlichen Vorkommnissen; sie sind nach gehäuften Anfällen, nach einem Status epilepticus auch recht oft ausgesprochen und dauern einige Zeit an. Am häufigsten aber kommen ein- oder beiderseitige Differenzen der Haut- und Sehnenreflexe, ein- oder beiderseitiges Babinskisches Phänomen vor. Diese Ausfallerscheinungen nach Anfällen sind Folgen histologischer Alterationen der Rinde, die nach gehäuften Anfällen besonders schwere sind.

Die Erschöpfungslähmungen können sich zu dauernden leichten Ausfallerscheinungen summieren, daher auch bei Fällen von Epilepsie ohne grobanatomischen Befund einseitige Symptome recht häufig sind. In anderen Fällen dürfte von vornherein eine stärkere Ausprägung des anatomischen Prozesses in bestimmten Partien gegeben sein. Dadurch sind Uebergänge zwischen der Entwicklungsepilepsie und der symptomatischen Epilepsie gegeben. Bei letzterer können die Anfälle vollständig den klassischen gleichen. Hier scheint es auf die speziellen pathologisch-anatomischen Bedingungen (Cysten, cystisches Oedem der Arachnoidea,

diffuse Veränderungen etc.) anzukommen, ob und in welcher Art sich eine Epilepsie entwickelt. Auch die Fälle von Epilepsie mit Hydrocephalus, Oxycephalus etc. bilden einen Übergang zwischen Entwicklungs- und symptomatischer Epilepsie.

Bei der Entwicklungsepilepsie läßt sich heute nicht mehr ein Fehlen anatomischer Veränderungen behaupten. Wir haben hier die Ammonshornsclerose, ein Mittelglied zwischen diffusen und umschriebenen Veränderungen; dazu kommen als häufig meningeale Prozesse chronische Veränderungen der Rinde, vor allem die Randgliose, außerdem die akuten, den Anfällen entsprechenden Veränderungen.

Eine große Rolle bei den Abgrenzungsversuchen der verschiedenen Arten von Epilepsie spielen die psychischen Symptome. Wichtig ist der psychische Habituuszustand, als dessen Prototyp die epileptische Charakterveränderung und Dementia gelten können. Sie können bei zweifellos genuiner Epilepsie fehlen, andererseits bei Fällen symptomatischer Epilepsie, wenn seit Jahren Anfälle bestehen, sich entwickeln.

Wir sehen also, daß es intra vitam unter Umständen recht schwierig ist, nur auf Grund des klinischen Befundes auf Grund der Anamnese zu entscheiden, welcher Kategorie ein Fall von Epilepsie angehört. Die Schädelröntgenuntersuchung gibt uns sehr oft wichtige Anhaltspunkte, auf Grund derer wir diese Entscheidung treffen können und liefert das Röntgenbild mitunter unzweifelhafte Hinweise für circumscribte Schädigungen des Gehirns.

Bei der Entwicklungsepilepsie findet man sehr häufig Schädelveränderungen, die durch Anomalien der Größe und Form des Schädels bedingt sind und

sich nicht selten mit Asymmetrie des Schädels kombinieren. Es kommen hier besonders in Betracht Mikrocephalie, Pseudomikrocephalie, Hydrokephalie und Kraniostenose infolge von prämaturner Nahtsynostose. Wir hatten schon oben von Mikrocephalie infolge von angeborener Bildungshemmung gesprochen, auch bei Wachstumshemmungen des Gehirns infolge Erkrankung desselben finden wir diese. Außer seiner Kleinheit ist der mikrokephale Schädel auch noch von abnormer Form. Mitunter findet man Liquor im Schädelraum wenn das Gehirn für den Schädel zu klein ist, oder eine Verdickung der Schädelwand, besonders der Schädelbasis. Das Verhalten der Nähte ist meist normal, doch kann mitunter eine Vereinfachung der Nahtzacken oder auch vorzeitige Nahtsynostose gefunden werden.

Die abnormen großen Schädel sind in den häufigsten Fällen durch Hydrokephalie verursacht und ist auch bei hydrokephaler Schädelvergrößerung die Epilepsie ein sehr häufiges klinisches Bild. Dadurch, daß das Kranium annähernd kugelige Form annimmt, verändert sich die Form des Schädels. Während die Orbitaldächer, die von der Schädelbasis am nachgiebigsten sind, abgeflacht sind, findet man die Sella turcica erweitert und die hintere Schädelgrube stark basal ausgebuchtet. Unverändert bleibt der Gesichtsteil des Schädels, der in den meisten Fällen zurücktritt. Erfolgt kein Stillstand der die Hydrokephalie bedingenden Ursachen, so ist die Schädelwand dünner als normal und man findet auch erweiterte Nahtstellen. Die Innenfläche der hydrocephalen Schädel ist von glatter Beschaffenheit, doch können auch die Impressiones digitatae ausgeprägt sein, wenn der Schädelinhalt mehr

zunimmt, als der Schädel selbst sich vergrößert. Ist die Hydrokephalie jedoch bedingt durch Herderkrankungen (Tumoren) des Gehirns, oder durch meningeale Erkrankungen, so vergrößert sich der Schädel überhaupt nicht, sondern es geht nur eine Verdünnung der Schädelwand vor sich.

Eine andere Art von Schäeldifformität als Ursache der Entwicklungsepilepsie ist die infolge präematurer Nahtsynostose, welche darin besteht, daß ein oder mehrere Nähte und Fugen des Schädels verknöchern, bevor der normale Zeitpunkt dafür da ist. Eine Ursache dieser vorzeitigen Synostose ist noch unbekannt. Durch präemature Nahtsynostose wird Wachstumsstörung hervorgerufen, welche sich darin äußert, daß die Ausdehnung des Schädels nicht in der auf den Verlauf der obliterierten Naht senkrechten Richtung erfolgt. Eine Kompensation geschieht oft dadurch, daß der Schädel sich in den übrigen Richtungen stärker ausdehnt, doch kann auch dies fehlen. Dann wächst der Schädel nicht in dem Maße wie der Schädelinhalt und infolgedessen wird der Schädel zu eng. Man spricht dann von Kraniostenose. Anatomisch läßt sich dies Mißverhältnis feststellen durch starke Ausprägung der Impressiones digitatae und hohe und spitze Jura cerebralia. Die Dicke des Schädels bei Kraniostenose ist meist geringer als normal. Sehr häufig weist eine äußere Befichtigung des Schädels nicht sofort auf die Diagnose Kraniostenose hin. Der Röntgenologie verdanken wir zum großen Teile die Erfolge hinsichtlich der Diagnosestellung.

Die am häufigsten vorkommende Form der Kraniostenose ist der Turmschädel, eine Schäeldifformität die man bei Epilepsie nicht allzu selten beobachten

kann. Der Turmschädel zeichnet sich vor allen Dingen durch seine abnorme Höhenentwicklung aus, die dadurch zustande kommt, daß die frontal verlaufenden Nähte und Fugen prä matur obliterieren und dadurch das Wachsen in der saggitalen Richtung behindert ist. Infolgedessen wächst der Schädel mit Hilfe der saggital verlaufenden Nähte in die Höhe. Das stärker wachsende Gehirn macht sich Platz, indem es die nachgiebigen und dünneren Parteen der Schädelwand vorwölbt. So entspricht der Gegend der großen Fontanelle eine buckelartige Vorwölbung des Bregma und der dünnen Schläfenschuppe eine Vortreibung der Schläfengegend. Außerdem findet man eine Verdünnung der ganzen Innenfläche in Form verstärkter Impressiones digitatæ und eine Vertiefung der Pacchionischen Gruben und Gefäßfurchen. Auch die Schädelbasis erfährt eine mangelhafte Längsausbildung, besonders die vordere Schädelgrube. Der Boden der Sella turcica ist häufig erweitert und vertieft. Auch die Atrophia nervi optici beim Turmschädel führt man auf die Drucksteigerung zurück und wird diese Auffassung bestätigt durch den günstigen Erfolg einer der oben erwähnten druckentlastenden Operationen.

Außer der primären prä maturen Nahtsynostose kennen wir auch eine sekundäre prä mature Nahtobliteration, die nach Erkrankung des Gehirns, der Hirnhäute sowie des Schädelinhaltes ausbricht und durch die auch epileptische Anfälle bedingt sein können. Es besteht auch hier ein Mißverhältnis zwischen Schädel und Gehirn, welches sich in verstärkten Impressiones digitatæ dartut. Der Schädel solcher Individuen kann entweder äußerlich betrachtet normal aber auch deformiert sein. Da man gefunden hat, daß nach abge-

laufenen Hirn- und Hirnhauterkrankungen, insbesondere in der Zeit der Pubertät unter dem Einflusse eines geringen hirndrucksteigernden Momentes plötzlich schwere cerebrale Symptome einsetzen können, so ist es angezeigt, in allen solchen Fällen mit Hilfe der Röntgenstrahlen nach Nahtobliterationen und Schädelufuren zu forschen und durch die erwähnten druckentlastenden Operationen solche Individuen vor gefährlichen Komplikationen zu bewahren.

Anschließend wollen wir uns noch kurz mit den Asymmetrieen des Schädels beschäftigen, wie sie bei Epilepsie sehr reichlich gefunden worden sind und auch auf dem Röntgenbilde gesehen werden können. Behrend fand, daß bei epileptischen Kindern das Hinterhaupt sehr schwach, der Schädel kugelförmig oder einseitig komprimiert sei. Benedikt untersucht 120 Epileptiker und fand in 85 Fällen einen atypischen Bau des Schädels. Eine Verkürzung des Parietalsbogens war eine der häufigsten Anomalien, die er feststellen konnte. Den hauptsächlichsten Grund bei der als Entwicklungskrankheit auftretenden Epilepsie sucht La Sègue in der Asymmetrie der Basis cranei und Stenose des Foramen magnum. Sehr häufig ist auch die Fronto-Faciale Asymmetrie bei Epileptikern, wie Bourneville und Sollier dies festgestellt haben.

Außer den beschriebenen Formanomalien findet man bei Epilepsie auch Veränderungen des Schädels die auf die Anwesenheit eines drucksteigernden intrakraniellen Prozesses oder eines Hirntumors hinweisen. Nicht selten gelingt es den Sitz von intrakraniellen Tumoren, welche nahe der Oberfläche des Gehirns liegen, oder von der Dura ihren Ausgangspunkt nehmen, aus lokalen Destruktionen der Schädelwand zu

erschließen. Derartige lokale Destruktionen kommen am Röntgenbild auch dann zur Anschauung, wenn sie die Schädelbasis betreffen, insbesondere den in allen Details stets gut erkennbaren Keilbeinkörper mit der Sella turcica. Eine besonders wichtige Gruppe von basalen Tumoren sind die Tumoren der Hypophyse. Am häufigsten begegnet man denselben bei der als Akromegalie bezeichneten Affektionen. Meistens sind es hier Adenome der Hypophyse, welche bei fortschreitendem Wachstum den Boden der Sattelgrube vertiefen und verdünnen und die Sattellehne usurieren, sodaß von derselben nur ein dünnes Blättchen übrig bleibt, das länger erscheint als in der Norm und wie zurückgelehnt. In relativ seltenen Fällen sind die Hypophysentumoren bei der Akromegalie so groß, daß sie den ganzen Keilbeinkörper destruieren. Aber selbst in diesen Fällen bleiben meistens die *Prozessus glinoidei anteriores* teilweise erhalten. Anders als die geschilderten Destruktionen des Keilbeinkörpers durch intrasellar gelegene Hypophysentumoren stellen sich die Usuren dar, welche durch oberhalb der Hypophyse gelegene, sogenannte Hypophysenganggeschwülste an der Sella turcica erzeugt werden. Diese Hypophysengangtumoren, welche meist nicht mit Akromegalie sondern mit Genitalatrophie und Fettsucht einhergehen, zerstören zunächst die vorspringenden Teile am Eingang der Sella turcica, die Sattellehne und die *Prozessus glinoidei anteriores*. Im Gegensatz zu den früher beschriebenen Destruktionen, bei welchen die Sattelgrube vertieft ist, erscheint sie hier abgeflacht und erweitert. Erst bei weiterem Wachstum der Geschwulst kann auch hier der Boden der Sella turcica destruiert werden. Es zeigt sich dann die gleiche Usur wie bei

den großen intrasellaren Hypophysentumoren bloß mit dem Unterschiede, daß auch meist die *Prozessus glinoidea anteriores* fehlen. Eine ganz ähnliche Destruktion des Keilbeinkörpers wie bei Hypophysengangstumoren findet sich aber auch als Folge der Druckwirkung anderweitig lokalisierter Hirntumoren, so wie überhaupt bei längerdauernden, drucksteigernden Prozessen innerhalb der Schädelhöhle. Jedoch trifft man in diesen Fällen außerdem Ufuren im Bereiche der übrigen inneren Schädelfläche an, in Form der vertieften Impressionen oder der Nahtdiastafen. Allerdings können Hypophysengangstumoren, wenn sie groß genug sind, außer der lokalen Ufur am Keilbeinkörper die gleichen diffusen Ufuren der Schädelinnenfläche verursachen, wie die anderweitig lokalisierten intrakraniellen Geschwülste. Immer aber bleiben sie unterscheidbar von den echten Hypophysentumoren, bei welchen der Schädel nicht verdünnt, sondern, wie bekannt, in charakteristischer Weise verdickt erscheint. Alle diese Veränderungen am Schädel sind am Röntgenbild in klarer Weise zu sehen und es ist offensichtlich, welche große klinische Bedeutung sie dadurch gewinnen.

Besteht ein Mißverhältnis zwischen Fassungsraum und Inhalt des Schädels, so ist die Folge die durch venöse Stauung hervorgerufene Vertiefung und Erweiterung jener leichten Furchen der Schädelinnenfläche, welche für die Sinus *duræ matris* bestimmt sind und außerdem eine mächtige Ausbildung des doppelten venösen kollateralen Kreislaufes, der in der *Diploë* der Schädelwand und in den weichen Schädeldecken gelegen ist. Wie sich die in der *Diploë* gelegenen Venennetze unter normalen und pathologischen Verhältnissen verhalten, haben wir durch Brechet erfahren.

Normalerweise sind die diploëtischen Venen dünne, meist nur 1-3 mm breite Hohlgänge. Die Zahl ist schwankend und auch die Lokalisation wechselnd. Bei dicken Schädeln, ferner bei weiblichen Individuen und im höheren Alter sind die diploëtischen Venenkanäle reichlicher entwickelt. Auch hier ist es durch das Röntgenbild möglich, die Beschaffenheit der Knochenkanäle des Schädels, welche das venöse Blut abführen, darzustellen. Man erkennt bei intrakranieller Drucksteigerung oder lokaler Kompression die betreffenden Kanäle als breite helle Streifen, während sie unter normalen Verhältnissen kaum erkennbar sind. Andere Schädelanomalieen, wie sie nicht allzu selten bei diffusen Erkrankungen des Gehirns, insbesondere solchen, die mit Epilepsie oder Psychosen einhergehen, gefunden werden, bilden die Verdickungen des Schädels. Da die harte Hirnhaut zugleich die Funktion des inneren Periostes der Schädelkapsel besitzt, so ist es nicht verwunderlich wenn infolge ihres chronischen Reizzustandes, wie er bei Tumoren der Dura oder bei langdauernden, häufig zu Hyperämien des Schädelinhalts führenden cerebralen Affektionen besteht, auch der Schädelknochen zur Wucherung angeregt wird. Es wird entweder das gesamte Kranium, oder nur Teile desselben betroffen, vor allen Dingen ist es das Stirnbein, oder aber die Schädelbasis, die man verdickt findet.

Auch die Veränderungen, die die Syphilis am Schädel hervorruft, seien hier erwähnt; kann sich doch auch die Syphilis des Schädels klinisch unter dem Bilde von Epilepsie äußern. Sie tritt am Schädel mit Vorliebe im Bereich des Schädeldaches auf und geht die Bildung des syphilitischen Granulationsgewebes vom Periost oder von der Dura aus. Durch das Röntgen-

bild ist es möglich, die anatomischen Einzelheiten der verschiedenen Stadien zur Anschauung zu bringen. Lues cerebri verrät sich am Röntgenbilde durch Schädeldefekte infolge von Gummen, durch diffuse und circumscripte Hyperostose oder Osteoporose des Schädels. Umschriebene Gummen sieht man als Defekt mit scharfen kreisförmigen oder nierenförmigen Rändern. Fleckige Aufhellungen des Knochenstättens deuten auf flächenhafte Ostitis syphilitica hin.

Anschließend an diese Erörterungen seien Fälle von Entwicklungs=symptomatischer= und Spätepilepsie angeführt und die auf dem Röntgenbilde festgestellten Schädelveränderungen beschrieben. Wir beginnen mit Fällen von Entwicklungs=epilepsie:

Fall 1). F. W. 23 Jahr. Hatte als Kind Masern, sonst stets gesund. Vom 19. Jahre an Krampfanfälle, welche alle 4-5 Wochen auftreten. Das Kranium ist deutlich rachitisch, Zähne gerieft, deutliche Kielbrust, Knorpelrippengegend ist noch etwas verdickt. Patientin ist leicht vergeßlich und klagt viel über Kopfschmerzen.

Schädel-Röntgenbild: Schädel dick, Stirnschuppe lacunär, hintere Wand des Türkenfells stark vorgewölbt, in der Höhe des Tentorium eine erhebliche Knochenverdickung. Keilbeinhöhle ziemlich groß.

Fall 2). P. H. 22 Jahre. Vater leidet an Lungentuberkulose, ein Bruder der Mutter hat in seinem 20. Lebensjahr an Epilepsie gelitten. Frühere Entwicklung des Patienten bis zur Pubertät war normal. Hatte früher keine ernstern Krankheiten. Im 16. Lebensjahr erster Krampfanfall, zuerst in $\frac{1}{2}$ dann in $\frac{1}{4}$ jährlichen Intervallen, meist nach vorausgegangener Anstrengung bei der Arbeit. Schädel ist im wesentlichen symmetrisch über den Augenbrauen starke Wülste, Stirn zurückfliehend

flach, leicht eingedellt. Spärliche Bartentwicklung. Flache Ohrleisten. Hoher spitzer Gaumen.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel dünn, hinterer Wall der Sella turcica auffällig hoch. Keine Stauung, Keilbeinhöhle groß ausgebildet. Kleinhirngrube nicht ausgeweitet

Fall 3). K. M. 20 Jahre. Hatte als Kind Masern. Seit dem 10. Lebensjahre, wo sich Krämpfe einstellten, begriff er schwerer. In letzter Zeit täglich kleine Anfälle. Das Gedächtnis ist für frühere Vergangenheit gut erhalten. Allgemeinkenntnisse sind recht dürftig, Urteilsvermögen ist herabgesetzt.

Schädel=Röntgenbild: Hypophyse groß, hinterer Wall sehr spitz, Stirnhirnschuppe auffällig dünn, die hintere Schädelgrube auffällig geräumig.

Fall 4). W. V. 23 Jahre. Seit dem 7. Lebensjahre Krämpfe. Auch die Mutter leidet an epileptischen Anfällen. Ein Bruder ist an Epilepsie gestorben. Seit dem 18. Lebensjahre treten die Anfälle heftiger auf. Er ist häufig stark verstimmt und leidet an epileptischen Dämmerzuständen.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel mitteldick, hinterer Wall der Sella turcica relativ hoch, Hypophysenraum mittelweit, hintere Schädelgrube mäßig weit. Keine Stauung, keine Verdickung.

Fall 5). H. W. 19 Jahre. Hatte als Kind Masern, Scharlach und Gehirnentzündung. Erste Periode mit 13 Jahren, stets vorhanden bis zum 16. Lebensjahre. Seitdem ist die Periode weggeblieben. Mit dem 15. Lebensjahr trat der erste Anfall auf. Täglich mehrere Anfälle von einer Dauer von 10-30 Minuten. Klagt über Kopfschmerzen und Mattigkeit, hat außerdem Absenzen, die mitunter 6 mal am Tag auftreten.

Schädel=Röntgenbefund: Hypophysenraum groß. hinterer Wall sehr spitzig. Die großen Venen der Konvexität geben deutlich Schatten. Hinterhauptschuppe deutlich. Hinterer Schädelraum mäßig erweitert.

Bei der Patientin wurde der Balkenstich vorgenommen: Typische Schnittführung, geringe Blutung aus dem Knochen, Dura bläulich verfärbt, nicht vorgewölbt, geringe Pulsation. Nach Eröffnung der Dura fließt wenig Liquor ab. Der Balken wird bei 6 cm durchstoßen, bei 7 cm wird der Boden des Ventrikels erreicht. Es fließt wenig blutig gefärbter Liquor ab.

Seit der Operation haben die Anfälle an Häufigkeit und Schwere ganz erheblich nachgelassen.

Fall 6). M. St. 31 Jahr. Bereits im 3. Jahre einen Krampfanfall. Erst im 10. Lebensjahre sind die Anfälle wieder aufgetreten. Kopfumfang 56 cm. Auffällig kongestiv, besonders Ohren, Wangen stark gerötet. Der Augenhintergrund zeigt nichts Besonderes. Geistig wenig gestört. Leidet an Polycytæmie.

Schädel=Röntgenbefund: Zahlreiche Diploëgefäße das Tentorium cerebelli gibt deutliche Schatten. Knochenanbildung etwas ungleichmäßig. Die großen Gefäße der Convexität schimmern deutlich durch. Hypophyse etwas vergrößert. Hinterer Wall der Sella turcica etwas erhöht.

Fall 7) M. W. 18 Jahr. Seit dem 11. Lebensjahr bestehen Krampfanfälle. Hat zeitweise auch hysterische Krämpfe. Psychisch nahezu inaktiv.

Schädel=Röntgenbefund: Stirnschuppe etwas lacunär. Hypophyse mittelweit. Hinterer Wall deutlich erhöht. Kleinhirngrube relativ klein. Scheitelgendung etwas verdickt.

Fall 8) G. B. 44 Jahr. Als Kind Diphtherie. Mit 22 Jahren zum ersten Mal Krämpfe, alle 14 Tage bis 3 Wochen. Später wurden Anfälle seltener. Dolichocephaler Kopf. Am linken Scheitelbein eine ca. 2 cm lange Narbe, die gut verheilt ist. Intelligenz gut.

Schädel-Röntgenbefund: Langgestreckter Schädel. Hypophyse etwas platt, mit hochgestelltem hinteren Wall. Hintere Schädelgrube breit aber flach. Stauung in den großen Venen nicht erheblich.

Fall 9) A. A. 32 Jahre. Seit dem 8. Jahre leidet er an Krampfanfällen. Seit einigen Jahren geistiger Verfall. Schädelumfang beträgt 55 cm. Schädel nicht klopfempfindlich. Augenhintergrund o. B. Vater soll infolge Geisteskrankheit gestorben sein. Patient hatte als Kind Rachitis, lernte spät laufen. In der Schule lernte er schwer. Trank früher viel Wein, in letzteren Jahren Bier und Schnaps.

Schädel-Röntgenbefund: Schädel dünn, Knochenanbildung gleichmäßig. Hypophyse relativ groß, hintere Schädelgrube weit. Tentorium cerebelli gibt deutlich Schatten. Keilbeinhöhle groß.

Fall 10) J. R. 16 Jahre. Mit $1\frac{1}{4}$ Jahren traten die ersten Krampfanfälle auf. Hatte mit 7 Jahren Schariach. Danach stellten sich wieder kurze Anfälle ein. Mit 14 Jahren nahmen die Krampfanfälle zu, Zuckungen wurden häufiger. Bewußtseinsstörung. Kopf asymmetrisch.

Schädel-Röntgenbefund: Kalkanbildung ungleichmäßig. Hypophyse relativ klein. Hinterer Wall der Sella turcica auffällig erhöht. Keilbeinhöhle mittelgroß. Es bestehen auffällig viel Diploëgefäße. Die großen Venen der Convexität geben deutlich Schatten.

Es wurde der Balkenstich ausgeführt: Schnittführung in typischer Weise rechts. Aus dem Knochen erhebliche Blutung, die durch sterilen Wachs gestillt wird. Dura leicht bläulich verfärbt, wenig vorgewölbt, leicht pulsierend. Nach Oeffnung der Dura fließt wenig blauer Liquor ab. Balken wird bei 6 cm durchstoßen. Es fließt langsam tropfenweise leicht blutiger Liquor ab. Ventrikel nicht auffallend erweitert.

Nach der Operation traten die Anfälle weniger häufiger auf, um dann überhaupt auszubleiben.

Fall 11) A. W. 33 Jahre. Hatte als Kind Masern Scharlach, Diphtherie. Erster Krampfanfall mit 1 $\frac{1}{2}$ Jahren. Die Anfälle dauerten bis zum 8. Jahre, doch waren sie meist nur von kurzer Dauer. Mit 20 Jahren hatte sie Influenza, im Anschluß daran traten Zustände auf, in denen sie nicht ganz klar war (Dämmerzustände). Seitdem treten Krampfanfälle gehäuft auf.

Schädel=Röntgenbefund: Der Schädel ist auffällig dünn, die hintere Schädelgrube deutlich erweitert, Hypophyse groß, desgleichen die Keilbeinhöhle, Stauungserscheinungen an den großen Venen nicht nachweisbar.

Fall 12) M. H. 29 Jahre. Bekam ersten Anfall mit 17 Jahren. Die Anfälle wiederholten sich fast alle 8 Tage. Leidet an Gedächtnisschwäche und zuckenden Kopfschmerzen in den Schläfen. Sie ist schwächlich gebaut, schmales, langes Gesicht, Schädel am Hinterkopf steil.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel klein. Knochenanbildung etwas ungleichmäßig. Hintere Schädelgrube etwas klein. Hypophyse etwas platt.

Fall 13) E. G. 35 Jahre. Klagte als Kind öfter über Schwindelanfälle. Im 12. Jahre trat der erste Krampfanfall mit klonischen Zuckungen auf. Zungen=

biß, Bewußtlosigkeit. Die Anfälle wiederholen sich in längeren Pausen, einmal bestand sogar 2 Jahre Pause. In letzter Zeit zuckt er mit den Extremitäten bei den Anfällen fast garnicht mehr. Schädelumfang 39 cm. Schädel nicht klopfempfindlich. Intelligenz nicht gestört.

Schädel=Röntgenbefund: Es bestehen weite Diploëgefäße. Hypophyse mittelweit. Hinterer Wall der Sella turcica etwas erhöht. Hintere Schädelgrube relativ klein und Schatten von Knochenauflagerungen zeigend.

Fall 14) O. U. 21 Jahre. Ein Bruder von ihm hat epileptische Anfälle. Patient litt schon früher an Schwindelanfällen. Vor ca 1 Jahre bekam er den ersten Krampfanfall. Anfälle treten unregelmäßig auf. Klagt jetzt über Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Schädelumfang 57 cm Schädelseite links klopfempfindlich. Gesichtsfarbe leicht kongestioniert. Das Auffassungsvermögen ist etwas erschwert, doch ist er gut orientiert.

Schädel=Röntgenbefund: Knochenanbildung ungleichmäßig. Hypophyse mittelweit, hinterer Wall deutlich erhöht. Hintere Schädelgrube erscheint klein. Hinterhauptschuppe verdickt.

Fall 15) E. Sch. 20 Jahre. Im 20. Lebensjahre bekam er den ersten epileptischen Anfall. War als Kind nie ernstlich krank. Anfälle treten jetzt alle 5-8 Tage auf. Schädel asymmetrisch. Linker Stirnhöcker weniger ausgebildet als der rechte. Schädelumfang 55,5 cm. Auffällig häufig wiederkehrende Zuckungen über beiden Augen, mitunter auch bis zum rechten Mundwinkel reichend. Klagt über ständige Kopfschmerzen in der linken Kopfseite.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel in der Basis etwas ausgewölbt. Hypophyse groß. Knochenanbil-

dung etwas ungleichmäßig. Deutliche Schatten der Venen der Convexität. Hintere Schädelgrube etwas geräumig.

Fall 16) F. W. 29 Jahre. Leidet seit seinem 20. Lebensjahre an Epilepsie. Die Anfälle kommen fast immer nachts. Auffällige Form des Schädels, die Hirnkapfel ist klein gegenüber dem Gesichtschädel, der Schädelumfang beträgt 56,5 cm.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel relativ dünn. Hinterhauptschuppe deutlich. Hintere Schädelgrube ist ganz erheblich erweitert, und die Konturen des Tentorium nach oben gewölbt. Große Keilbeinhöhle.

Fall 17) M. Sch. 18 Jahre. Seit dem Auftreten der Menfes mit 16 Jahren Krampfanfälle. Die Anfälle traten erst alle $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Jahre auf, dann alle 6-8 Wochen, in letzter Zeit fast alle 4 Wochen. Schädel rund geformt, nicht klopfempfindlich. Augenhintergrund normal. Intelligenz nicht gestört.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel dünn, Stirnschuppe etwas lacunär, Kalkanbildung ungleichmäßig. Hinterer Wall der Hypophyse etwas erhöht, Keilbeinhöhle etwas vergrößert.

Es folgen jetzt 2 Fälle von symptomatischer Epilepsie:

Fall 1) W. S. 26 Jahre. Leidet zeitweise an Krampfanfällen. Im Anfang habe er noch Erinnerung dann verliert er das Bewußtsein. Mit 18 Jahren syphilitische Infektion. Blutprobe bisher negativ gewesen. Einmal hat er auch Bandwurm durchgemacht. Schädel nicht klopfempfindlich. Augenhintergrund: rechte Sehnervenpapille konturiert. Schläfenseite etwas lichter. Etwas Venenpuls. Links ist die Färbung ganz normal. Keine Intelligenzstörung.

Schädel=Röntgenbefund: Zeigt normale Schädel= form, ungleichmäßig Kalkanbildung. Hypophyse mittel.

Fall 2) K. 62 Jahre. Früher stets gesund gewesen. Seit Jahren täglich schweren Rotwein getrunken und sehr stark geraucht. Mit 55 Jahren bekam er einen Schwindelanfall. Seit dieser Zeit habe er in großen Intervallen noch 5 ähnliche Anfälle mit epileptiformen Zuckungen gehabt. Rechte Pupille etwas weiter als linke, bei Belichtung reagiert rechte erheblich träger als linke. Er leidet an Gedächtnisschwäche und Sprach= störung. Klinische Diagnose: Epilepsie mit Arteriosclerose.

Schädel=Röntgenbefund: Auffällige Verdickung im Stirnhirn, Hypophyse groß, Kalkanbildung gleichmäßig.

Endlich wollen wir noch Schädel=Röntgenbefund bei Spätepilepsie beschreiben.

Fall 1) L. G. 44 Jahre. Mit 40 Jahren sollen die ersten Krampfanfälle aufgetreten sein. Angeblich nach Aufregung. Seitdem alle 3-14 Tage ein Anfall. Leidet an Dämmerzuständen.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel auffällig dünn, Hypophyse erheblich vergrößert. Hintere Schädelgrube relativ weit, keine deutliche Stauung.

Fall 2) K. W. 37 Jahre. Mit 32 Jahren erster Anfall und zwar nach starker geistiger Anstrengung. Die Anfälle nahmen an Häufigkeit zu. Das Gedächtnis hat seitdem etwas abgenommen, Schädel im wesentlichen symmetrisch. Augenhintergrund bietet nichts Krankhaftes.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel dünn. Die Vene der Convexität deutlich sichtbar. Hinterhauptsgrube deutlich erweitert, Hypophyse relativ groß.

Fall 3) W. F. 31 Jahre. Epileptische Anfälle traten erst im 30. Lebensjahre auf. Hat zeitweise Kopf=

schmerzen, fühlt sich matt. Schädel ist nicht klopfempfindlich. Augenhintergrund normal. Ist schwachsinzig.

Schädel=Röntgenbefund: Schädel dünn. Kalkanbildung gleichmäßig. Hypophyse groß. Hinterer Wall der Sella turcica stark vorragend. Hintere Schädelgrube erscheint geräumig.

Fall 4) O. M. 38 Jahre. Bekam mit 35 Jahren den ersten epileptischen Anfall. Die Anfälle wiederholten sich von dann öfter und zwar alle 2-3 Wochen. Es bestehen Zuckungen. Kopfform ist klein und rund. Schädelumfang 55,5 cm. Hinterhauptschuppe ist leicht prominent.

Schädel=Röntgenbefund: Gleichmäßige Kalkanbildung, auffällig große Keilbeinhöhle. Hintere Schädelgrube ohne Abnormitäten.

Mit zu den häufigsten Schädelveränderungen bei Epilepsie gehören die durch ein Trauma hervorgerufenen. Beim Trauma müssen wir einen Unterschied machen zwischen den Erschütterungen des Zentralnervensystems und den Verletzungen des Kopfes. Kopferschütterung, auch ohne jede anatomische Läsion kann Epilepsie hervorrufen, wie dies Westphal gezeigt hat. Wie selten ist man in der Lage mit Sicherheit festzustellen, daß die diffuse Erschütterung des Zentralnervensystems, die durch Sturz, Schlag etc. entstanden ist, das Leiden ausschließlich verursacht hat. Wahrscheinlich muß in diesen Fällen, wo Epilepsie auf ein Kopftrauma folgte, zu diesem noch ein in der Organisation des Gehirns selbst gegebenes Moment hinzukommen. (Pathologische Zustände der Gefäßwand der Gehirngefäße mit größerer Brüchigkeit, mangelnde Restitutionsverhältnisse nach vorangegangener Blutung).

Anders zu beurteilen sind natürlich diejenigen Fälle von traumatischer Epilepsie, die durch Verletzungen des Kopfes (Wunden der Weichteile, Verletzungen des Schädelskeletts, Hirnläsionen), kompliziert sind. Es wirken hierbei zwei Ursachen zusammen: die traumatische Erschütterung und ferner der mechanische Reiz, den die Verwundung oder die Narben auf umschriebenen Stellen des Gehirns ausüben. Zwischen der Schädelverletzung und dem Ausbruch der Epilepsie können oft Jahre liegen, wie dies durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt ist. Die durch Verletzungen hervorgerufenen Schädigungen des Schädelinhalts stellen sich dar entweder als Hirnerschütterung, wobei keine makroskopischen Veränderungen existieren, oder als Kontusionen und Zerreißungen des Gehirns, seiner Häute und Blutgefäße. Die Stelle der Hirnverletzung steht meist in enger Beziehung zu der Stelle der Schädelverletzung. Durch spitze und scharfe Instrumente hervorgerufene Verletzungen weisen am Schädeldach, das sie meist mitbetreffen eine Dislokation der Knochenfragmente auf (Impressionsfraktur), während die Verletzungen durch stumpfe Gewalt sich in Formen einfacher Fissuren präsentieren. Eine Kombination dieser beiden Arten findet sich bei Schußverletzungen. Es ist klar, daß die röntgenologische Untersuchungsmethode eine unentbehrliche Ergänzung der sonstigen Untersuchungsmethoden bedeutet. Bei Schußverletzungen ist es möglich, das Vorhandensein eines Projektils festzustellen und auch den Ort, wo es sich befindet, genau zu bestimmen, ev. auch den Weg herauszufinden, den das Projektil bis zur Erreichung seiner am Röntgenbild erkennbaren Ruhelage eingeschlagen hat.

Sehr wichtig ist die Untersuchung mit Röntgenstrahlen dann, wenn man durch die äußere Untersuchung nicht feststellen kann, ob eine Kontinuitätstrennung vorhanden ist und wo sie sich lokalisiert. Dies ist häufig bei Schädelbasisbrüchen der Fall. Hier kann man sich durch das Röntgenbild darüber orientieren, ob Fissuren oder Nahtdehisen vorhanden sind. Kennt man die Stelle und den Verlauf der basalen Kontinuitätstrennung, so ist auch die Entscheidung möglich, ob und wo sich Verletzungen des Schädelinhalts finden können, denn eine direkte Darstellung von Verletzungen intrakranieller Gebilde ist ja nur dann möglich, wenn sich eine Verkalkung des traumatischen Erweichungsherde eingestellt hat. Bilden sich nach einem Trauma hirndrucksteigernde Prozesse, (Hydrocephalus, Tumor cerebri), so sind diese natürlich auch durch die oben beschriebenen Röntgenbefunde des Schädels nachzuweisen und sind ein wertvoller Fingerzeig für die Entstehung der Epilepsie.

Dem zuletzt Gefagten seien noch einige Fälle von traumatischer Epilepsie angeschlossen:

Fall 1) P. B. 13 Jahre. Erlitt mit 6 Jahren einen Automobilunfall. Mit 11 Jahren stellten sich Ohnmachtsanfälle ein, dieselben nahmen zu und entwickelten sich zu krampfartigen Anfällen. Wenig ausgeprägter Scheitel- und Stirnhöcker. An der linken Stirngegend Narben, angeblich von damaligem Unfall. Ist leicht erregbar.

Schädel-Röntgenbefund: Auffällig dünner Schädel. Venen der Convexität erscheinen deutlich. Hypophyse etwas plattgedrückt. Hinterer Schädelraum klein. Schatten des Tentoriums auffällig deutlich. Es wurde der Balkenstich ausgeführt.

Typische Schnittführung. Geringe Knochenblutung. Dura wenig vorgewölbt. Geringe Pulsation. Nach

Öffnung der Dura fließt sehr wenig klarer Liquor ab. Balken wird bei 5 cm durchstoßen. Boden des Ventrikels bei 6 cm erreicht. Es fließt kein Liquor ab. Versuch mit dickerer Kanüle ebenso erfolglos.

Fall 2) E. H. 18 Jahre. Die Mutter ist in Gegenwart der Patientin plötzlich an Schlaganfall gestorben, worüber sie sehr heftig erschrocken ist. Seitdem (11. Lebensjahre) leidet sie an Krampfanfällen. Jetzt treten die Anfälle im Vergleich zu früher weniger häufig auf. Nach den Anfällen besteht mehrstündiger Schlaf und etwa einen Tag anhaltende retrograde Amnesie für die letzten Ereignisse vor dem Anfall.

Schädel-Röntgenbefund: Kopf klein. Stirnschuppe lacunär. Die Venen der Convexität erscheinen deutlich. Hintere Schädelgrube erscheint in mäßigem Grade sehr verengt.

Fall 3) N. K. 20 Jahre. Wurde 1915 durch Infanterieschuß in die rechte Kopfseite verletzt. Im Anschluß daran starke Eiterung. Schädelaufmeißlung und Knochenplastik. Nach der Verwundung einige Krampfanfälle. Seit der Militärentlassung aber keine mehr. Den ersten Anfall bekam er wieder Juli 1917. Über der rechten Stirn, in der Mitte zwischen oberen Augenhöhlenrand und Haargrenze eine querverlaufende 8 cm lange Narbe, mit Knochendefekt, die auf Druck empfindlich ist.

Schädel-Röntgenbefund: Hypophyse relativ groß, Keilbeinhöhle sehr weit. Knochenanbildung allseits gleichmäßig.

Fall 4) F. B. 27 Jahre. Als Soldat mit 20 Jahren stürzte er von einem 4 m hohen Gerüst auf die linke Kopfseite. Seit dieser Zeit leidet er an Kopfschmerzen. Etwa 8 Tage nach dem Unfall fiel er beim Posten-

stehen bewußtlos um. Von da ab litt er öfter an diesen Bewußtseinsstörungen und außerdem auch an Krampfanfällen. An der linken Scheitelgegend befindet sich eine kleine alte Narbe, die gegen die Unterlage nicht verschieblich ist, anscheinend mit Knochendefekt. Der Schädel ist in dieser Gegend klopfempfindlich. Der linke Hinterhauptsnerv und der linke obere Augenhöhlennerv sind druckempfindlich. Psychisch ist er etwas gehemmt.

Schädel-Röntgenbefund: Stirnschuppe etwas verdünnt. Hypophyse von irregulärer Kontur. Hinterhauptsrube relativ klein.

Fall 5) W. M. 21 Jahre. Mit 16 Jahren wurde er von einem Arbeitskollegen von einem Stück Eisen am linken Hinterkopf getroffen. Er habe sich danach sofort überschlagen und sei einige Minuten bewußtlos gewesen. Ein halbes Jahr darnach ist der erste Krampfanfall aufgetreten und seitdem leidet er auch an Dämmerzuständen. Schädelumfang 58,5 cm. Am linken Hinterhaupt, etwa 4 cm von der Mittellinie entfernt, dicht über dem Hinterhauptshöcker, kleine reaktionslose, verschiebliche Narbe. Psychisch besteht Abnahme des Gedächtnisses.

Schädel-Röntgenbefund: Gleichmäßige Kalkanbildung. Etwas vergrößerte Hypophyse. Hinterhauptsrube relativ klein.


Zum Schluß sei noch ein Fall von Epilepsie erwähnt wo erst durch das Röntgenbild objektive Anhaltspunkte für die traumatische Aetiologie durch den Nachweis eines Gefchoßmantels gewonnen wurden und wo durch Exstirpation dieses Gefchoßmantels die Epielepsie zur Heilung gebracht wurde.

Fall 6) C. K. 19 Jahre. Vorgeschichte: Als einjähriges Kind wurde die Patientin in Amerika von einem Neger mit einem Revolver in den Kopf geschossen. Das Geschoß drang durch die linke Schädelhälfte ein. Es wurde aber damals, trotz Untersuchungen mit Röntgenstrahlen kein Geschoß im Schädel festgestellt. Bis zum 16. Lebensjahre war Patientin immer beschwerdefrei. Seit dieser Zeit leidet sie an epileptischen Anfällen, die anfangs alle halbe Jahre auftraten, in der letzten Zeit jedoch häufiger geworden sind. Patientin hat die Anfälle nur nachts. Die Menstruation ist unregelmäßig. Sie hat oft monatelang, einmal sogar ein Jahr lang ausgesetzt.


Befund: Junges Mädchen, kräftig entwickelt, mit sehr starkem Fettpolster. Organe der Brust und Bauchhöhle ohne nachweisbare krankhafte Veränderungen. Auf dem Hinterkopf, etwas links von der Mittellinie, etwa 5 cm lange, querverlaufende Narbe. An der Stelle der Narbe ist die Haut eingezogen. Es ist ein fast markstückgroßer Knochendefekt mit gezackten Rändern vorhanden. Die Narbe ist nirgends druckschmerzhaft. Objektiv nachweisbare Veränderungen im Bereich des Nervensystems liegen nicht vor, auch an den Augen kein krankhafter Befund.

Schädel-Röntgenbefund: An den Übergang vom Scheitel zum Hinterhaupt, etwas unterhalb der Falx cerebri ein etwa $2\frac{1}{2}$ cm langer und $1\frac{1}{2}$ cm breiter Geschoßteil (Geschoßmantel). Hinter demselben ist etwa 2 cm von der kleinen Fontanelle eine 4 cm lange und 3 cm breite ovale Knochenlücke.

Die Operation wurde in Lokalanästhesie am 5. März 1917 vorgenommen. Exzision und Verlängerung der Narbe nach vorn und hinten. In mehreren Schichten



Seitliche Aufnahme des Schädels von C. K.
(Schadelfraktur hat an der Platte angelegen).



Frontale Aufnahme des Schädels von C. K.
wird die sich tief in das Gehirn fortsetzende von mehreren Cysten durchsetzte Narbe, möglichst vollständig excidiert. Der markstückgroße Defekt im Schädel wird auf Dreimarkstückgröße erweitert, und das Hirn zwischen der am Knochen adhärenenten Dura und der Pia ohne Schwierigkeiten ringsum gelöst. Sondierung mit feiner Nadel ergibt, daß das Geschoß in etwa 3-4 cm Tiefe

liegt. Es wird mit einer Kornzange extrahiert. Blutung gering.

7. III. Anfälle von tonischen Krämpfen, beginnen in beiden Händen, dann auch im rechten Fuß. Beim Blick nach oben ein vertikaler Nyctagmus. Pupillen sind gleich. Einschränkung des Gesichtsfeldes scheint nicht vorhanden zu sein. Bindehautreflexe sind links deutlich, rechts dagegen bedeutend herabgesetzt. Vorstrecken der Hände ohne Zittern. Auch bei Augenschluß keine Unsicherheit. Händedruck läßt keinen Unterschied erkennen. Ellenbogenreflexe nicht auffällig gestört. Isolierte Bewegungen gehen gut von statten. Patellarreflexe rechts nicht auslösbar, links minimal angedeutet. Fußsohlenreflexe normal. Rechts Andeutung von Babinski, links Beugung. Bauchhautreflexe sind beiderseits vorhanden. Psychisch vollkommen frei.

25. III. Zum dritten Male Krampfanfälle. Beginn in der rechten Hand. Daumen eingeschlagen, dann im ganzen Arm und den übrigen Gliedern. Fäuste sind nicht starr, sondern weich geschlossen. Mund und Augen verzerren sich nach rechts. Dauer des Krampfes ca. 2-3 Minuten. Zungenbisse. Aura 10 Minuten vorher bemerkbar, Kopfschmerzen.

18. IV. Es bestehen ab und zu noch Krampfanfälle; die sich in ihrer Art stets gleich waren, doch die sichtlich an Häufigkeit und Schwere nachlassen. Patient steht seit 5 Tagen auf.

25. IV. Seit 19. IV. ist kein Krampfanfall mehr aufgetreten. Beim Gehen fällt auf, daß Patientin noch ziemlich stark schwankt, und zwar sind die Excursionen ziemlich grobe und auffallend langsam. Zeitweilig, namentlich, wenn sie in Unterhaltung begriffen ist, tritt das Schwanken deutlich hervor. Ist lustig und redselig.

30. IV. Dauernd guter Stimmung. Es ist kein Anfall wieder aufgetreten.

4. V. Das Schwanken beim Gehen ist verschwunden. Sie geht allein aus. Befinden und Stimmung sind sehr gut. Da bis jetzt kein Anfall wieder aufgetreten ist, wird sie als gebessert nach Haus entlassen.

Es ergibt sich also, daß bei Fällen von Epilepsie, wo Traumen ätiologisch angeschuldigt werden, die Röntgenuntersuchung sehr wichtige Details, die der bloßen Betrachtung und Palpation entgehen können, oder unzugänglich sind, aufdecken kann. Es ist daher unbedingt notwendig, in Fällen von traumatischer Epilepsie, sei es nun, daß forensische Momente oder operative Eingriffe in Betracht kommen die Röntgenuntersuchung heranzuziehen.

Zusammenfassend können wir sagen, daß der diagnostische Wert der Röntgenuntersuchung bei Epilepsie sehr groß ist. Nicht nur in Fällen, in denen Traumen ätiologisch sind, kann das Röntgenbild sehr wertvolle Anhaltspunkte geben; die Röntgenuntersuchung läßt auch Formen und Größenanomalieen des Schädels feststellen und differenzieren. Sie deckt Hyperostosen der Schädelwand, seien sie nun circumscripirt oder diffus auf und sie liefert endlich auch wichtige Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Herdkrankungen des Gehirns.

Eine für die Theorie und Praxis sehr bemerkenswerte Tatsache ist, daß bei ca. 30% aller Epileptiker positive Röntgenbefunde bei der Schädeluntersuchung erhoben werden können.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Anton für die gütige Überlassung der Arbeit, für die mir gewährte Unterstützung und endlich für die Übernahme des Referates meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Literatur.

1. Féré: Epilepsie.
 2. Binswanger: Die Epilepsie. 1913.
 3. Binswanger: Die klinische Stellung der sogenannten genuinen Epilepsie. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol. Bd. 32.
 4. Lewandowsky: Handbuch für Neurologie. 1910.
 5. Schüller: Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Kopfes 1912
 6. Schüller: Schädelveränderungen bei intrakranieller Drucksteigerung. Ztschr. f. Nervenheilkunde Bd. 45.
 7. Redlich: Ueber die Beziehungen der genuinen zur symptomatischen Epilepsie. Ztschr. f. Nervenheilkunde. Bd. 36.
 8. Redlich-Schüller: Ueber Röntgenbefunde am Schädel vom Epileptiker. Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Bd. 14.
 9. Benedikt: Röntgenbefunde bei Epilepsie. Wiener klinische Wochenschr. 1908.
 10. Kolaczek: Ein Beitrag zur operativen Behandlung der traumatischen Epilepsie. Z. f. Nervenheilkunde. Bd. 47,
-

Lebenslauf.

Karl Johannes Jentzsch, geboren 25. Februar 1890 zu Dresden als Sohn eines Kaufmannes, evgl. sächsischer Staatsangehöriger. Besuchte das Annen-Realgymnasium zu Dresden, bestand Ostern 1910 das Abitur, diente dann $\frac{1}{2}$ Jahr bei dem Kgl. Sächs. l. Leib=Grenadier=Rgt. 100, studierte Medizin in Jena, bestand daselbst das Tetamenphysikum im Juli 1913. Studierte weiter in Berlin und Kiel und war von Anfang August 1914 bis Ende Oktober 1918 im Felde. Studierte dann in Halle und beendete Juli 1919 das ärztliche Staatsexamen. Erhielt unter dem 16. Juli 1919 die Approbation als Arzt. Tag des Colloquium 9. Oktober 1919.

Mit Dank gedenke ich folgender akademischer Lehrer: Jena

Maurer, Biedermann; Knorr, Wien, Stahl, Plate, Lubosch Noll, v. Egeling,

Berlin:

Lewin, Goldscheider, Michaelis, Bockenheimer, Passow, Lesser, Flügge, Straßmann,

Kiel:

Heine, Anschütz, Lüthje, Stöckel, Lubarsch, v. Stark, Höhne, Bauereisen,

Halle:

Anton, Benecke, Denker, Schieck, Sellheim, Schmieden, Vollhard, Schmidt, Stoeltzner, Groß, Grouven, Stieda, Mohr, Eisler, Lindemann, Claussen.
